





농촌진흥청

과수 탄저병 예방 및 관리 요령

- 과수 생육에 맞는 초기 방제가 중요합니다.



탄저병이란?



발생원인

콜레토티리쿰(*Colletotrichum spp.*)속 곰팡이에 의해 발생하며 빗물에 의해 비산되어 번짐

발생시기

고온다습한 환경조건이 조성되면 병 발생

발생증상

과실 표면에 갈색의 원형반점이 생겨 상품성이 크게 떨어짐

주요 과수(사과, 복숭아, 단감) 탄저병 증상



사과



복숭아



단감

과종별 집중관리 기간



복숭아(6~7월)



사과(8~9월)



단감(9~10월)

탄저병 방제



탄저병 방제 시기



사과·복숭아 (5월~8월)



단감 (5월~9월)

탄저병 방제 요령

- ✓ 병 발생 전 예방 약제 살포가 중요
- ✓ 발생 초기 유효성분 및 계통이 다른 약제를 번갈아 살포




탄저병 관리 요령



- ✓ 과수원 내외부 병든 잔재물을 제거
- ✓ 감염된 과실은 조기에 제거해 병원체 밀도를 낮춤
- ✓ 과수원 주변 기주식물* 관리

* 기주식물 : 병원균이 머물 수 있는 아카시나무, 호두나무 등



과수 탄저병 예방을 위해
발생 전 초기 억제살포에
적극 협조하여 주시기 바랍니다.

